Publicación Julio 2025

Radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) en cáncer de próstata con recaída local

Experiencia Institucional de COR - Consultorio de Oncología y Radioterapia

LUONGO Mauricio[1,2], BENÍTEZ Andrea[2], ROA Lourdes[4], FERRET Ana[4], MELEAN Estefani[2], BENTANCUR Catalina[3], TRINCA William[6], DENIS William[4], MAZZA Mariana[4], BRITOS Martin[4], BERMUDES Veronica[4], GARCÍA Laura[5], OLIVERA Nadidne[4], ROLDÁN Santiago[3], MENDOZA Ineiris[2], DE ROSA Alejandro[2].

1. Director Técnico 2. Oncólogo Radioterapeuta
3. Médico Residente 4. Médico General
5. Licenciados Fisicomédicos 6. Tecnólogos

Introducción

El cáncer de próstata es un tumor frecuente, con una incidencia a nivel mundial de 1.467.854 nuevos casos según datos de Globocan 2022, situándose en el cuarto lugar en incidencia y en el octavo en mortalidad, con 397.430 muertes.

En Uruguay esta enfermedad también es muy común. Según el Registro Nacional del Cáncer *(período 2017-2021)*, la incidencia supera los 1.416 casos anuales. Más del 50% de los diagnósticos se realizan en hombres entre los 60 y 80 años, aunque también afecta a adultos más jóvenes, quienes tienen pronósticos de vida superiores a 10 años.

con cualquier modalidad de rescate local.

Según guias y recomendaciones internacionales, en recaidas prostáticas luego de un primer curso de

(D'Agostino et al., 2019), de alta precisión, baja tasa de efectos secundarios, rápida recuperación para el paciente y de corta duración, lo que lo hace conveniente tanto para los pacientes como para los sistemas de